



LA COQUELUCHE

La coqueluche peut-être une maladie grave chez les nourrissons, la femme enceinte et les personnes âgées¹

1 ÈRES causes de décès
par infection bactérienne chez les nourrissons entre 10 jours et deux mois de vie.²

2 ÈME maladie la plus contagieuse après la rougeole⁴



Hospitalisation
systématique des moins de 3 mois³

1 personne atteinte de coqueluche en contamine **15⁵**

Comment se transmet-elle ?



Principalement par les gouttelettes aériennes provoquées par la toux.¹



La maladie se manifeste par une toux surnommée... Le « Chant du coq »
devenant quinteuse, épuisante et répétée, de jour comme de nuit et durant plusieurs semaines.¹

1. Vaccination info service. La coqueluche. Disponible sur: <https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Coqueluche>
2. Floret D. Groupe de pathologie infectieuse pédiatrique, Groupe francophone de réanimation et urgence pédiatrique. « Les décès par infection bactérienne communautaire. Enquête dans les services de réanimation pédiatrique français. » Arch Pédiatr 2001 ; 8 suppl 4 : 705-11
3. Inserm. La coqueluche. Disponible sur : <https://www.inserm.fr/dossier/coqueluche/>
4. Santé sur le net. Rougeole. Disponible sur: <https://www.sante-sur-le-net.fr/Pathologies/Rougeole/>
5. Cohen R et al. Pertussis vaccination coverage among French parents of infants after 10 years of cocoon strategy. Médecine et maladies infectieuses 46 (2016) 188-193.

Transmission
par un membre de la
famille dans près de
9 cas sur 10¹



L'importance de
protéger les
nourrissons contre
la coqueluche



La HAS recommande **la vaccination des femmes enceintes** pendant la grossesse contre la **coqueluche** dans le but de prévenir la coqueluche chez les nouveau-nés et les très jeunes nourrissons avant leur schéma de primovaccination par le transfert transplacentaire d'anticorps maternels.²

LA VACCINATION DE LA FEMME ENCEINTE CONTRE LA COQUELUCHE

- Est recommandée dès le 2ème trimestre de grossesse, de préférence entre **20 et 36 semaines d'aménorrhée**
- Est recommandée à **chaque grossesse**
- **Peut protéger** les nouveau-nés **pour 1 à 3 mois** contre la coqueluche³



VÉRIFIER LE STATUT VACCINAL DE LA FEMME ENCEINTE AVANT DE VÉRIFIER CELUI DE L'ENTOURAGE (stratégie du cocooning)⁴

La vaccination de l'entourage s'appliquera :

- En **l'absence de la vaccination contre la coqueluche** de la femme enceinte
- En cas de naissance moins d'un mois après la vaccination (ex : **naissance prématurée**)



1. Santé Publique France. La coqueluche disponible sur <https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/coqueluche>

2. Kilgore, P. E., Salim, A. M., Zervos, M. J., & Schmitt, H. J. (2016). Pertussis: Microbiology, Disease, Treatment, and Prevention. Clinical microbiology reviews, 29(3), 449–486.
<https://doi.org/10.1128/CMR.00083-15>

3. Haute Autorité de Santé - Recommandation vaccinale contre la coqueluche chez la femme enceinte. Disponible sur: https://www.has-sante.fr/jcms/p_3084228/fr/recommandation-vaccinale-contre-la-coqueluche-chez-la-femme-enceinte

4. Calendrier des vaccinations. Disponible sur: <https://sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal>