


LA COQUELUCHE



La **coqueluche** peut être une maladie **grave** chez les nourrissons, les femmes enceintes et les personnes âgées.¹

1 L'UNE DES
ÈRES
causes de décès
par infection bactérienne chez
les nourrissons entre 10 jours et
deux mois de vie.²



Hospitalisation
systématique des
moins de 3 mois³

2 ÈME
maladie la plus
contagieuse
après la rougeole.⁴

1 personne
atteinte de
coqueluche
en contamine **15**⁵

Comment
se transmet-elle ?



Principalement par les
gouttelettes aériennes
provoquées par la toux.¹



La maladie se manifeste
par une toux surnommée...
Le « Chant du coq »
devenant quinteuse, épuisante
et répétée, de jour comme de nuit
et durant plusieurs semaines.¹

¹ Vaccination Info Service - Les maladies et leurs vaccins [En ligne, consulté le 10 juin 2022].

² Floret D. Groupe de pathologie infectieuse pédiatrique, Groupe francophone de réanimation et urgence pédiatrique. « Les décès par infection bactérienne communautaire. Enquête dans les services de réanimation pédiatrique français. » Arch Pédiatr 2001; 8 suppl 4 : 705-11

³ Inserm - Coqueluche, « la toux des 100 jours » est revenue [En ligne, consulté le 10 juin 2022].

⁴ Santé sur le net - Rougeole, Ebola, grippe : quel virus est le plus contagieux [En ligne, consulté le 10 juin 2022].

⁵ Cohen R et al. Pertussis vaccination coverage among French parents of infants after 10 years of cocoon strategy. Médecine et maladies infectieuses 46 (2016) 188-193.

sanofi

Transmission
par un membre de la
famille dans près de
9 cas sur 10¹



L'importance
de protéger les
nourrissons contre
la coqueluche

La HAS recommande la **vaccination des femmes enceintes** pendant la grossesse contre la **coqueluche** dans le but de prévenir la coqueluche chez les nouveau-nés et les très jeunes nourrissons avant leur schéma de primovaccination par le transfert transplacentaire d'anticorps maternels.

LA VACCINATION DE LA FEMME ENCEINTE CONTRE LA COQUELUCHE

- Est recommandée dès le 2^{ème} trimestre de grossesse, de préférence entre **20 et 36 semaines d'aménorrhée**
- Est recommandée à **chaque grossesse**
- **Peut protéger** les nouveau-nés pour **1 à 3 mois** contre la coqueluche²



**VÉRIFIER LE STATUT VACCINAL
DE LA FEMME ENCEINTE AVANT DE
VÉRIFIER CELUI DE L'ENTOURAGE
(stratégie du cocooning)³**

La vaccination de l'entourage s'appliquera :

- En l'**absence de la vaccination contre la coqueluche** de la femme enceinte
- En cas de naissance moins d'un mois après la vaccination (ex : **naissance prématurée**)

¹ Santé Publique France. Principales caractéristiques des cas de coqueluche identifiés par le réseau Renacoq, 1996-2015. Disponible sur <https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/coqueluche/donnees> (consulté le 10 juin 2022).

² Haute Autorité de Santé. Recommandation vaccinale contre la coqueluche chez la femme enceinte. Saint-Denis La Plaine: HAS; 2022.

³ Calendrier des vaccinations et recommandations en vigueur.